

Zorgprogramma COPD	Landelijk gemiddelde 2022	2022	2021	2020	2019	2018
Prevalentie	1,91 %	1,37 %	1,45 %	1,52 %	1,58 %	1,64 %
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar specialist	24,94 %	31,64 %	31,11 %	31,81 %	32,92 %	33,50 %
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma	15,37 %	10,88 %	10,65 %	10,95 %	13,45 %	14,85 %
Percentage patiënten in zorgprogramma	47,61 %	51,13 %	51,92 %	49,70 %	50,24 %	49,25 %
Percentage patiënten zonder hoofdbehandelaar	12,05 %	6,35 %	6,32 %	7,53 %	3,39 %	2,40 %
Percentage patiënten met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd	59,72 %	63,42 %	67,71 %	63,06 %	73,16 %	78,45 %
Percentage patiënten bij wie functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd	66,92 %	65,76 %	71,04 %	68,56 %	76,35 %	82,37 %
Percentage patiënten bij wie mate van bewegen is gecontroleerd	71,77 %	70,60 %	72,20 %	71,15 %	78,34 %	82,13 %
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd	78,42 %	73,68 %	79,61 %	78,06 %	84,77 %	89,09 %
Percentage patiënten dat rookt	35,41 %	44,08 %	44,81 %	42,61 %	45,16 %	45,34 %
Percentage patiënten met twee of meer longaanvallen	2,62 %	3,68 %	2,44 %	3,94 %	4,31 %	3,39 %