

	Zorgprogramma HVZ	Landelijk gemiddelde 2022	2022	2021	2020	2019	2018
Prevalentie		5,57 %	2,70 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar specialist		18,29 %	22,26 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma		9,61 %	9,20 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten in zorgprogramma		62,28 %	60,63 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten zonder hoofdbehandelaar		9,81 %	7,91 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode		83,10 %	74,41 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten 70 jr of jonger met adequaat gereguleerde systolische bloeddruk		81,59 %	76,09 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten 70 jr of jonger met gereguleerd LDL		67,19 %	73,18 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten 70 jr of jonger met streng gereguleerd LDL		27,46 %	39,85 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd		81,59 %	69,55 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten dat rookt		11,16 %	15,80 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten bij wie eGFR is bepaald in afgelopen jaar		86,43 %	80,54 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %
Percentage patiënten bij wie mate van bewegen is gecontroleerd		69,84 %	55,50 %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %	n.v.h. %